

# Chapitre 3. Statistiques à 1 variable

Yann Barsamian

École Européenne de Bruxelles 1

Année scolaire 2020–2021



- Rappels de S4 (moyenne, médiane, quartiles, boîte à moustaches)
- Fluctuation d'échantillons
- Écart-type

Soit une série statistique prenant  $p$  différentes valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_p$  (les  $x_i$ ) et où chaque valeur  $x_i$  (pour  $1 \leq i \leq p$ ) a pour effectif  $n_i$ . Par exemple, une étude sur 30 élèves concernant le temps de travail journalier (en minutes) à la maison donne les résultats suivants :

$x_i$	5	10	15	20	30	40	50	70
$n_i$	1	4	4	3	7	7	3	1

Dans ce tableau, on lit par exemple que 4 élèves travaillent 20 minutes par jour à la maison.

1) La moyenne<sup>1</sup> :

La moyenne est notée  $\bar{x}$ . C'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Lorsque l'on a des effectifs pour les valeurs, il faut pondérer la moyenne : on multiplie chaque valeur par l'effectif, et on divise par l'effectif total (qui se calcule par  $n_1 + n_2 + \dots + n_p$  si l'énoncé ne le donne pas).

$$\bar{x} = \frac{n_1 \cdot x_1 + n_2 \cdot x_2 + \dots + n_p \cdot x_p}{n_1 + n_2 + \dots + n_p}$$

$x_i$	5	10	15	20	30	40	50	70
$n_i$	1	4	4	3	7	7	3	1

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1 \cdot 5 + 4 \cdot 10 + 4 \cdot 15 + 3 \cdot 20 + 7 \cdot 30 + 7 \cdot 40 + 3 \cdot 50 + 1 \cdot 70}{30} \\ &= \frac{875 \div 5}{30 \div 5} = \frac{175}{6} \approx 29,17. \text{ Ainsi, les élèves travaillent en moyenne} \\ &\underline{29,17 \text{ minutes par jour.}} \end{aligned}$$

1. [https://www.youtube.com/watch?v=88\\_16UbkdZM](https://www.youtube.com/watch?v=88_16UbkdZM)

Remarque importante : quand on a une série donnée par classes d'intervalles, on prend pour valeur d'une classe la valeur centrale de la classe pour faire les calculs.

Exemple similaire à précédemment, où on a demandé aux élèves dans quelle tranche leur travail journalier se situait (toujours 30 élèves) :

Temps	[0 ; 15[	[15 ; 30[	[30 ; 45[	[45 ; 60[	[60 ; 75[
Effectif	5	7	14	3	1

Pour la tranche [0; 15[ on utiliserait la valeur 7,5, pour la tranche [15; 30[ on utiliserait la valeur 22,5, etc.

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 7,5 + 7 \cdot 22,5 + 14 \cdot 37,5 + 3 \cdot 52,5 + 1 \cdot 67,5}{30} = 31,5. \text{ Ainsi,}$$

les élèves travaillent en moyenne 31,5 minutes par jour.

## 2) La médiane<sup>2</sup> :

La médiane sépare la série en deux parties de même effectif : au moins 50% des valeurs qui sont inférieures ou égales à la médiane, et au moins 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane.

Pour calculer la médiane d'une série de  $n$  nombres, on commence par ordonner les valeurs de manière croissante :

$$u_1 \leq u_2 \leq \dots \leq u_n$$

- si  $n$  est impair, c'est la valeur centrale : celle de rang  $\frac{n+1}{2}$   
Ex. : 2, 5, 7, 8, 9 : la valeur de rang  $\frac{5+1}{2} = 3$  : c'est 7
- si  $n$  est pair, c'est le nombre au milieu des deux valeurs centrales : la demi-somme des valeurs de rang  $\frac{n}{2}$  et  $\frac{n}{2} + 1$   
Ex. : 2, 5, 7, 8, 9, 12 : la demi-somme des valeurs de rang  $\frac{6}{2} = 3$  et  $\frac{6}{2} + 1 = 4$  : c'est  $\frac{7+8}{2} = 7,5$

---

2. <https://www.youtube.com/watch?v=g1OCTw--VYQ>

Médiane avec effectifs :

$x_i$	5	10	15	20	30	40	50	70
$n_i$	1	4	4	3	7	7	3	1
$n_i$ cum.	1	5	9	12	19	26	29	30

Ici on a 30 valeurs, la médiane est donc la demi-somme des valeurs  $\frac{30}{2} = 15$  et  $\frac{30}{2} + 1 = 16$ . Où sont ces valeurs ? Pour le savoir, on peut construire le tableau des effectifs cumulés.

On lit que les valeurs de rang 15 et 16 sont toutes les deux égales à 30, donc la médiane vaut  $\frac{30+30}{2} = 30$ . Il y a au moins 50% des élèves qui travaillent 30 minutes ou moins, et il y a au moins 50% des élèves qui travaillent 30 minutes ou plus.

3) Les quartiles<sup>3</sup> :

Le 1<sup>er</sup> quartile Q1 (3<sup>ème</sup> quartile Q3) : la plus petite valeur de la série supérieure ou égale à au moins 25% (75%) des valeurs.

Le rang de Q1 (Q3) est le premier entier supérieur ou égal à  $\frac{n}{4}$  ( $\frac{3n}{4}$ ), c'est-à-dire 25% (75%) de  $p$ .

$x_i$	5	10	15	20	30	40	50	70
$n_i$	1	4	4	3	7	7	3	1
$n_i$ cum.	1	5	9	12	19	26	29	30

- $\frac{30}{4} = 7,5$  donc Q1 est la 8e valeur.
- $\frac{3 \times 30}{4} = 22,5$  donc Q3 est la 23e valeur.

---

3. <https://www.youtube.com/watch?v=Yjh-9nMVmEw>,  
<https://www.youtube.com/watch?v=IjsDK00Dwlw>



3) Les quartiles<sup>3</sup> :

Le 1<sup>er</sup> quartile Q1 (3<sup>ème</sup> quartile Q3) : la plus petite valeur de la série supérieure ou égale à au moins 25% (75%) des valeurs.

Le rang de Q1 (Q3) est le premier entier supérieur ou égal à  $\frac{n}{4}$  ( $\frac{3n}{4}$ ), c'est-à-dire 25% (75%) de  $n$ .

$x_i$	5	10	15	20	30	40	50	70
$n_i$	1	4	4	3	7	7	3	1
$n_i$ cum.	1	5	9	12	19	26	29	30

- $\frac{30}{4} = 7,5$  donc Q1 est la 8e valeur. C'est 15.
- $\frac{3 \times 30}{4} = 22,5$  donc Q3 est la 23e valeur.

---

3. <https://www.youtube.com/watch?v=Yjh-9nMVmEw>,  
<https://www.youtube.com/watch?v=IjsDK00Dwlw>

3) Les quartiles<sup>3</sup> :

Le 1<sup>er</sup> quartile Q1 (3<sup>ème</sup> quartile Q3) : la plus petite valeur de la série supérieure ou égale à au moins 25% (75%) des valeurs.

Le rang de Q1 (Q3) est le premier entier supérieur ou égal à  $\frac{n}{4}$  ( $\frac{3n}{4}$ ), c'est-à-dire 25% (75%) de  $n$ .


$x_i$	5	10	15	20	30	40	50	70
$n_i$	1	4	4	3	7	7	3	1
$n_i$ cum.	1	5	9	12	19	26	29	30

- $\frac{30}{4} = 7,5$  donc Q1 est la 8e valeur. C'est 15.
- $\frac{3 \times 30}{4} = 22,5$  donc Q3 est la 23e valeur. C'est 40.


---

3. <https://www.youtube.com/watch?v=Yjh-9nMVmEw>,  
<https://www.youtube.com/watch?v=IjsDK00Dwlw>


40% des -45 ans sont des fumeurs. . . quelques échantillons :



Taille 100



Taille 1000



Taille 10000

## 1) L'écart-type<sup>4</sup> :

L'écart-type est noté  $\sigma(x)$ . Il représente une mesure de dispersion autour de la moyenne. Plus  $\sigma(x)$  est grand, plus les  $x_i$  sont dispersées.

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{n_1 \cdot (x_1 - \bar{x})^2 + n_2 \cdot (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_p \cdot (x_p - \bar{x})^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_p}}$$

$x_i$	5	10	15	20	30	40	50	70
$n_i$	1	4	4	3	7	7	3	1

On avait calculé la moyenne qui valait  $\frac{175}{6}$ . Le calcul donne  $\sigma(x) =$

$$\sqrt{\frac{1 \cdot (5 - \frac{175}{6})^2 + 4 \cdot (10 - \frac{175}{6})^2 + \dots + 1 \cdot (70 - \frac{175}{6})^2}{30}} \approx 15,17.$$

Remarque : on définit également la variance  $V(x)$ , c'est le carré de l'écart-type ( $V(x) = \sigma(x)^2$  ou  $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$ ).

4. <https://www.youtube.com/watch?v=CiFoBkipJQk>.



## Moyenne et écart-type

Pour une série statistique prenant  $p$  différentes valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_p$  (les  $x_i$ ) et où chaque valeur  $x_i$  a pour effectif  $n_i$ , les formules pour la moyenne et l'écart-type sont les suivantes :

$$\bar{x} = \frac{n_1 \cdot x_1 + n_2 \cdot x_2 + \dots + n_p \cdot x_p}{n_1 + n_2 + \dots + n_p}$$

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{n_1 \cdot (x_1 - \bar{x})^2 + n_2 \cdot (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_p \cdot (x_p - \bar{x})^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_p}}$$



## Médiane et quartiles

Pour une série statistique comprenant  $n$  valeurs (pas forcément différentes), on calcule la médiane et les quartiles de la manière suivante :

- Médiane :
  - $n$  impair : valeur centrale ; rang  $\frac{n+1}{2}$
  - $n$  pair : au milieu des deux valeurs centrales ; rang  $\frac{n}{2}$  et  $\frac{n+1}{2}$   
(dans ce cas, ce n'est pas forcément une valeur de la série)
- Q1 : son rang est le premier entier  $\geq \frac{n}{4}$
- Q3 : son rang est le premier entier  $\geq \frac{3n}{4}$

2) Propriétés de la moyenne et de l'écart-type :

a) Quand on ajoute à toutes les valeurs d'une série  $x$  un nombre  $a$ , et qu'on nomme la nouvelle série  $y$ . C'est-à-dire, si la série initiale est  $x_1, x_2, \dots, x_p$ , et que la nouvelle série est

$$y_1 = x_1 + a, y_2 = x_2 + a, \dots, y_p = x_p + a$$

- $\bar{y} = \bar{x} + a$
- $\sigma(y) = \sigma(x)$

b) Quand on multiplie toutes les valeurs d'une série  $x$  par un nombre  $m$ , et qu'on nomme la nouvelle série  $z$ . C'est-à-dire, si la série initiale est  $x_1, x_2, \dots, x_p$ , et que la nouvelle série est

$$z_1 = x_1 \times m, z_2 = x_2 \times m, \dots, z_p = x_p \times m$$

- $\bar{z} = \bar{x} \times m$
- $\sigma(z) = \sigma(x) \times m$


## IV/ Outil technologique

Nous devons aller en salle informatique pour les statistiques. À la place, je vous propose de découvrir depuis chez vous l'outil Geogebra que vous utiliserez régulièrement jusqu'au bac.

Vous pouvez accéder à l'outil en ligne, sans rien installer, au bout du lien suivant : <https://www.geogebra.org/classic>

La première chose à faire est d'ouvrir le tableur, qui permet ensuite l'outil statistique. Cliquer sur le bouton en haut à droite du papier quadrillé (le bouton avec 3 barres horizontales, un triangle et un cercle), puis cliquer sur le bouton avec les trois points (verticaux, pas horizontaux comme dans Teams), puis cliquer sur Tableur.

(puis, diapo suivante)





Ensuite, deux vidéos d'introduction sont disponibles aux liens suivants :

- Sans effectifs :

<https://www.youtube.com/watch?v=3fUPcLHdHgo>

- Avec effectifs :

<https://www.youtube.com/watch?v=NaozDGh1kC8>

Faites les exercices 2 et 3 de la feuille d'exercices :

[http://www.barsamian.am/2020-2021/S5P6/Chap3\\_Statistiques\\_exos.pdf](http://www.barsamian.am/2020-2021/S5P6/Chap3_Statistiques_exos.pdf)