


1 Des questions auxquelles vous savez répondre

Voici la courbe qui donne le prix en dollars d'un baril de pétrole en fonction du temps en années.



Source : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

“Quel est le prix d'un baril de pétrole en l'année 1987 ?” : c'est la lecture de $f(1987)$.

“En quelle(s) année(s) le baril de pétrole a-t-il coûté 20\$?” : c'est la résolution de l'équation $f(x) = 20$.


“En quelle(s) année(s) le baril de pétrole a-t-il coûté 30\$ ou moins ?” : c'est la résolution de l'inéquation $f(x) \leq 30$.

Remarque très importante : le graphique d'une fonction f , c'est l'ensemble des points $(x; f(x))$ pour toute valeur x dans l'ensemble de définition de f .

2 Comment déterminer des images ?

2.1 Graphiquement :

Les images se lisent en ordonnées (axe vertical). Quand on demande l'image de -2 par une fonction f (c'est-à-dire $f(-2)$), on place -2 en abscisse (sur l'axe horizontal) et on lit l'ordonnée correspondante.




Exemple 1 : déterminer graphiquement les images de -2 ; $-1,5$; -1 ; 0 ; 1 ; $1,5$; 2 et 3 par la fonction f dont la courbe est donnée ci-contre :

2.2 Par le calcul :

Pour calculer l'image de 2 par f , c'est-à-dire calculer $f(2)$, on remplace x par 2 dans l'expression de $f(x)$.

Exemple 2 : soit la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x + 1,3$. Déterminer $f(2)$, $f(-3)$ et $f(0,5)$.



Exemple 5 : résoudre graphiquement (on donne la courbe de la fonction f ci-contre) :


$f(x) = 4$	$f(x) < 4$	$f(x) \geq 4$
$f(x) = 0$	$f(x) < 0$	$f(x) \geq 0$
$f(x) = -2$	$f(x) \leq -2$	$f(x) > -2$

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ revient à trouver les nombres x qui ont la même image par f et par g , ce qui revient à déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes \mathcal{C}_f et \mathcal{C}_g .

Résoudre l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ revient à trouver les nombres x qui ont une image par f supérieure ou égale à leur image par g , ce qui revient à déterminer les abscisses des points de \mathcal{C}_f qui sont au-dessus de \mathcal{C}_g .

Exemple 6 : on donne les courbes de deux fonctions f et g . Résoudre graphiquement :

$$f(x) = g(x) \quad f(x) > g(x) \quad f(x) \geq g(x)$$



5 Construire un graphique

On peut regarder à la calculatrice à quoi le graphique ressemble, puis construire un tableau de valeurs.

Par exemple pour tracer la courbe représentative de la fonction f définie sur $[-1; 5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$, on rentre l'expression dans la calculatrice et on trace la courbe. On demande un tableau de valeurs sur cet intervalle (une dizaine de points suffit) :

x	-1	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5
$f(x)$	6	1	-2	-2,75	-3	-2,75	-2	1	6

On n'a plus qu'à placer les différents points de coordonnées $(x; f(x))$ et on relie.

6 Trouver des paramètres

Parfois on définit une fonction à paramètres. Par exemple on définit une fonction f sinusoïdale par $f(x) = a \times \sin(bx + c) + d$ avec comme paramètres a , b , c et d . On a vu en cours comment on a pu retrouver ces paramètres à partir de données sur la fonction. On peut aussi retrouver ces paramètres à partir d'un graphique (c'est équivalent, car le fait de connaître un point A sur le graphique de f , ce qui se note $A \in \mathcal{C}_f$, c'est équivalent à $f(x_A) = y_A$).

On donnera plusieurs exemples dans le cours.

7 Exercices d'application

1. Soit h définie sur $[-5; 1]$ par $h(x) = x^2 + 4x + 2$.

- (a) Après avoir rempli le tableau de valeurs de la fonction h ci-dessous, tracer sa courbe représentative C_h dans un repère orthonormé.


x	-5	-4	-3	-2,5	-2	-1,5	-1	0	1
$h(x)$									

- (b) Donner le tableau de variations de h .
 (c) Résoudre graphiquement $h(x) = 2$; $h(x) > 2$ et $h(x) \leq 2$
 (d) Donner un encadrement de $h(x)$ pour $x \in [-4; -1]$
 (e) Est-ce que le point $C(-2; -1)$ appartient à la courbe C_h ?

2. On donne ci-contre C_g , la courbe représentative de la fonction g .

Déterminer (on pourra utiliser des valeurs approchées, le cas échéant) :

- (a) L'ensemble de définition D_g de g .
 (b) Les images par g de -4, 0 et 4.
 (c) L'ensemble des antécédents par g de :
 -1; 0; 6 et 5.
 (d) Le tableau de variations de g .
 (e) Le maximum et le minimum de g sur D_g .
 (f) S'il est vrai que $g(4) = g(-1)$?
 Que $g(3) = -\frac{g(-2)}{2}$?



3. Soit f une fonction dont on donne la courbe représentative C_f ci-après :

- (a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
 (b) Construire le tableau de variations de f .
 (c) Déterminer le maximum et le minimum de f sur D_f . Pour quelles valeurs sont-ils atteints ?
 (d) Déterminer les encadrements suivants :
- Si $-3 \leq x \leq 0$, alors $\dots \leq f(x) \leq \dots$
 - Si $0 \leq x \leq 3$, alors $\dots \leq f(x) \leq \dots$
 - Si $-3 \leq x \leq 3$, alors $\dots \leq f(x) \leq \dots$
 - Si $0 \leq x \leq 4,5$, alors $\dots \leq f(x) \leq \dots$

