

MATHÉMATIQUES 5 PÉRIODES

PARTIE B

DATE : JJ/MM/AAAA

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 120 minutes

EXAMEN AVEC OUTIL TECHNOLOGIQUE

MATÉRIELS AUTORISÉS :

Outil technologique

Recueil de formules

Notes :

- Comme il s'agit d'un modèle de document, la page de couverture est susceptible de changer.
- Cet exemple d'épreuve ne doit être utilisé que pour voir comment des questions peuvent être créées à partir du programme d'études en se concentrant sur les compétences plutôt que strictement sur le contenu.
- Les mots-clés figurant dans le programme d'études sont mis en évidence en gras pour aider le candidat à voir sur quelle compétence porte la question et l'aider ainsi à répondre à la question.

PARTIE B

Question 1/4

Points

Tom et Simon jouent à un jeu de société. Chaque fois que Tom parvient à déplacer son pion d'un tour complet sur le plateau, il obtient 5 points. Chaque fois que Simon réussit à déplacer son pion d'un tour complet sur le plateau, il obtient 10% de la quantité précédente. Ils commencent tous les deux avec 10 points.

- a) **Calculer** le score total de Tom après avoir fait 20 fois le tour du plateau. 2
 - b) **Écrire** en fonction de n , l'expression de $T(n)$ donnant le score de Tom après n déplacements d'un tour sur le plateau. 2
 - c) Si l'on suppose que le score de Simon après n tours autour du plateau peut être modélisé par une suite géométrique, **expliquer** l'utilisation de la formule : 2
- $$S(n) = 11 \cdot 1,1^{n-1}$$
- d) Simon et Tom ont fait le même nombre de fois le tour du plateau. Le score de Simon vient de dépasser celui de Tom. 3
Trouver combien de fois ils ont fait le tour du plateau.

Tom défie Simon à un jeu de dés. Deux dés à six faces sont lancés et la somme des scores est notée. Pour une somme inférieure à 6 Simon reçoit 10 centimes, pour une somme comprise entre 6 et 9, Simon perd 5 centimes et pour une somme supérieure ou égale à 10, Simon reçoit 30 centimes. Les gains sont déterminés par la distribution de probabilité ci-dessous, où la variable aléatoire N est la somme des scores.

N	$n < 6$	$6 \leq n \leq 9$	$n \geq 10$
Gains n	10 centimes	-5 centimes	30 centimes
$P(N = n)$	a	$\frac{20}{36}$	b


- e) **Montrer** que $a = \frac{10}{36}$ et $b = \frac{6}{36}$. 2
- f) **Calculer** l'espérance des gains de Simon dans ce jeu et dites si cela vaut la peine que Simon y joue. 2
- g) Un jeu est dit équitable si l'espérance des gains est égale à 0. 2
Déterminer combien de centimes doivent être perdus pour une somme comprise entre 6 et 9 afin que ce jeu soit équitable.

PARTIE B


Question 2/4

Points

Un fabricant d'aires de jeux pour enfants souhaite proposer à ses clients un nouveau modèle de toboggan. Il crée un diagramme du toboggan proposé en projection oblique :



Le profil de cette glissière est mesuré en mètres et peut être modélisé par la fonction F définie par $F(x) = (ax - b)e^{-x}$ pour $1 \leq x \leq 4$ où a et b sont deux paramètres. La fonction F a été représentée ci-dessous.



- a) On prévoit que la tangente à la fonction F au point d'abscisse $x = 1$ soit horizontale.

3

Déterminer la valeur du paramètre b .

- b) Il est également prévu que le sommet du toboggan soit à 1,85 mètres.

2

Déterminer la valeur du paramètre a .

Le profil du mur est finalement modélisé par la fonction F définie par $F(x) = 5x \cdot e^{-x}$.

- c) **Montrer** que l'aire totale de chaque paroi latérale, ombrée sur le diagramme, est égale à $5 - \frac{25}{e^4}$ m².

2

- d) **Déterminer** le point du toboggan où la pente est la plus grande.

3

PARTIE B

Question 3/4

Points

Les détecteurs de fumée optiques contiennent une cellule photoélectrique comme composant important. Une usine produit à cet effet des cellules photoélectriques. Un dispositif vérifie automatiquement les cellules photoélectriques et rejette celles qui sont défectueuses. En moyenne, il est précis à 86%. Cependant, on constate que la précision du dispositif varie - parfois il détecte un pourcentage plus élevé de cellules photoélectriques défectueuses et parfois un pourcentage plus faible. On constate que la précision du dispositif est modélisée par une distribution normale avec un écart type de 5%.

- a) **Déterminer** la probabilité que le dispositif soit précis à moins de 85%. 1
- b) $\frac{9}{10}$ du temps, le dispositif est précis à moins de $x\%$. **Déterminer** x . 2
- c) Sachant qu'un jour déterminé, le dispositif a une précision inférieure à 90%, **déterminer** la probabilité qu'il ait une précision supérieure à 85%. 2

La fiabilité de deux types de détecteurs de fumée optiques est testée. Plus la probabilité qu'une alarme soit déclenchée est élevée, plus le détecteur est fiable.

Le type A contient une seule photocellule et se déclenche lorsque cette photocellule est activée.

Le type B contient trois cellules photoélectriques et se déclenche si au moins deux des trois cellules photoélectriques sont activées.

La probabilité qu'une cellule photoélectrique soit activée en présence de fumée est p . La probabilité que les deux types d'alarme soient déclenchés est calculée pour différentes valeurs de p .

$P(A_p)$ est la probabilité que le type A soit déclenché lorsque la probabilité est p , $P(B_p)$ est la probabilité que le type B soit déclenché lorsque la probabilité est p .

- d) **Compléter** le tableau ci-dessous. 4

p	0,3	0,5	0,7
$P(A_p)$	0,3	0,5	0,7
$P(B_p)$			
Type plus fiable			

- e) **Déterminer** pour quelle valeur de p , le type B devient plus fiable que le type A. 2
- f) **Montrer** que l'on a les expressions suivantes en fonction de p : 4

$$P(A_p) = p \text{ et } P(B_p) = -2p^3 + 3p^2.$$

- g) **Expliquer** la signification de la fonction R suivante par rapport au contexte de la question. 3

Expliquer les calculs des lignes (1) à (3) et **interpréter** le résultat.

$$R: p \mapsto R(p) = -2p^3 + 3p^2 - p$$

$$(1) R'(p) = -6p^2 + 6p - 1$$

$$(2) R'(p) = 0 \Rightarrow p_1 \approx 0,79$$

$$(3) R''(p_1) < 0$$

PARTIE B**Question 4/4****Points**

Soit plan E d'équation $2x_1 - x_2 + 3x_3 = 5$ et pour chaque valeur $a \in \mathbb{R}$, une droite g_a d'équation paramétrique :

$$g_a: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 2 \end{pmatrix}$$

a) **Déterminer** les coordonnées de l'intersection de la droite g_a avec le plan E en fonction de a .

4

b) **Trouver** pour quelle valeur de a il n'y a pas de solution.

3

Interpréter le résultat de manière géométrique.