Exercise 1 Calc. : ✗

La durée du jour $L(t)$ en heures à un endroit donné a été enregistrée sur une année. Elle peut être modélisée par la fonction

$$L(t) = 4 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{365}t\right) + 12,$$

où t est le temps exprimé en jours.

Interpréter le résultat de $\int_0^{365} L(t)\,\mathrm{d}t$ et **expliquer** pourquoi ce résultat est égal à $12 \cdot 365 = 4\,380$. 5 marks

Exercise 2 Calc. : ✗

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 7x + 3$.

Déterminer la primitive F de f telle que $F(2) = 5$. 5 marks

Exercise 3 Calc. : ✗

Voici la courbe de la fonction définie par : 5 marks

$$f(x) = x^2 + 2x + 3$$



Un étudiant veut trouver une approximation de :

$$\int_{-4}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$$

a) **Expliquez**, en vous référant au graphique, ce que signifie cette notation.

b) À l'aide du graphique, **estimez** cette valeur par le calcul des rectangles rosés.

c) Pensez-vous que cette estimation est au-dessus ou en dessous par rapport à la valeur réelle ? **Expliquez**.

Exercise 4 Calc. : ✗

Soit la courbe d'une fonction f définie par le graphique ci-dessous.
On s'intéresse à l'aire de la partie colorée.



1. **Expliquer** pourquoi l'aire de la partie colorée n'est pas égale à $\int_{-1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x$. — 2 marks

2. **Calculer** l'aire de la partie colorée en unités d'aires (u.a.), en utilisant les résultats suivants : — 3 marks

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x \approx 4,07 \text{ u.a.} \qquad \int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x \approx -1,93 \text{ u.a.} \qquad \int_{3}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x \approx 0,47 \text{ u.a.}$$

Exercise 5 Calc. : ✗

Soit G une primitive telle que $G(x) = x^3 - x^2 - 3x + c$ où c est une constante réelle.

1. **Déterminer** l'expression de la primitive G telle que $G(2) = 4$. — 2 marks

2. **Montrer** que G est une primitive de la fonction g : — 1 mark
   $g(x) = 3x^2 - 2x - 3$

3. On admet que $G(x) = x^3 - x^2 - 3x + 6$. **Calculer** : — 2 marks

$$\int_{0}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x$$

Exercise 6 Calc. : ✗

Soit la courbe de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$.



Calculer à l'aide de la méthode des rectangles, en utilisant les rectangles inférieurs représentés ci-dessus, une approximation de l'aire délimitée par la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 5$. 5 marks

Exercise 7 Calc. : ✗

Soient trois courbes représentatives de fonctions C_1, C_2 et C_3 dans le repère ci-dessous.
Identifier parmi ces trois courbes : laquelle est la fonction f, laquelle est F, la primitive de f, et laquelle est f', la dérivée de f. **Justifier** votre réponse.

5 marks



Exercise 8 Calc. : ✗

As part of their leaving school celebrations, a group of S7 students from a European School go camping. Their tent door is in the shape of a parabola with height, $f(x)$, and width, x, and can be modelled as:

$$f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}$$

Both the height, $f(x)$, and width, x, of the tent door are, given, in metres.
The graph of $y = f(x)$ is shown.
Show that the area of the tent door is 2 m^2.



5 marks

Exercise 9 Calc. : ✗

Consider $F(x)$ the primitive of the function $f(x)$:

$$F(x) = \frac{1}{4}x^4 + 2$$

The graph of the function $f(x)$ is shown in the diagram below.

Find the value of b if the shaded area is 20 units^2, knowing that $b > 1$. 5 marks



Exercise 10 Calc. : ✗

The function $F(x) = \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 2$ is a primitive function of $f(x)$.

Consider the graph of the function $f(x)$ shown below.

Show that the shaded area bounded by the graph of $f(x)$, the lines $x = -1$ and $x = 1$, and the x-axis is equal to 4 square units. 5 marks



Exercise 11 Calc. : ✗

Consider the graph of $f(x)$ shown below.

Given that $A = 1.37$ and $B = 4.50$, **find** $\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$. — 5 marks



Exercise 12 Calc. : ✗

On considère les fonctions f et F définies par

$$f(x) = 4x^3 + 3x^2 \qquad \text{et} \qquad F(x) = x^4 + x^3 + 5.$$

a) **Montrer** que F est une primitive de f. — 2 marks

b) **Calculer** $\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$. — 3 marks

Exercise 13 Calc. : ✗

La figure ci-dessous montre le graphique d'une fonction f et deux surfaces S_1 et S_2 délimitées par le graphique de f et l'axe des abscisses.
Le graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère.



On donne : $\int_{-4}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = 7$.

a) **Interpréter** l'intégrale $\int_{-4}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x$ graphiquement. — 2 marks

b) **Déterminer** — 3 marks

1. $\int_{0}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x$.
2. $\int_{-4}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x$.
3. l'aire de la surface S_2.

Exercise 14 Calc. : ✗

A new company logo is shown on the right and will be made out of steel to be displayed outside the headquarters.
The curve is defined by the function $y = f(x)$.



a) **Identify** which two of the following integrals would correctly calculate the area of steel required. — 2.5 marks

1. $\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{2}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$
2. $\int_{0}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$
3. $\int_{0}^{3} |f(x)|\,\mathrm{d}x$
4. $\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{2}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$

b) **Explain** why the other integrals would give an incorrect answer. — 2.5 marks

Exercise 15 Calc. : ✗

Let $f(x) > g(x)$ be two positive functions, with respective primitives $F(x)$ and $G(x)$. It is further known, that:

x	1	4
$F(x)$	-3	8
$G(x)$	2	6

Determine the area bounded by the graphs of $f(x)$ and $g(x)$ and the lines of equations $x = 1$ and $x = 4$. — 5 marks

Exercise 16 Calc. : ✗

The graph of the function $y = f(x)$ is presented here:



Given the following results:

$$\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = 2.3 \qquad \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = -1.1 \qquad \int_b^d f(x)\,\mathrm{d}x = -0.4$$

. . . **calculate** the value of the shaded area. — 5 marks

Exercise 17 Calc. : ✗

State if the following sentences are True (T) or False (F) and **justify** your statements:

a) The point $\mathrm{A}(\mathrm{e}; 1)$ belongs to the function $y = \ln(x)$. — 1 mark

b) When a function is positive, its first derivative is necessarily increasing. — 1 mark

c) Let f be a function defined by $f(x) = \mathrm{e}^x - 1$. Its first derivative is equal to zero for $x = 0$. — 1 mark

d) Let f be a function defined over $\mathbb{R}$ such that $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x > 0$ and $\int_3^6 f(x)\,\mathrm{d}x < 0$. — 1 mark

We can thus write : $\int_0^6 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$

e) A set of bivariate data points $(x; y)$ has a linear correlation coefficient of -0.95. We can thus state that the correlation is weak. — 1 mark

Exercise 18 Calc. : ✗

5 marks

Let f and g be functions that are defined as follows:

$$f(x) = x^2 - 2x + 2 \quad \text{and} \quad g(x) = x + 2$$

and shown in the graph on the right.



a) **Explain** what $\int_0^3 |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x$ represents graphically (you can reproduce the graph on your answer sheet and show your answer on the graph).

b) **Calculate** $\int_0^3 |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x$.

Exercise 19 Calc. : ✗

5 marks

On donne les graphes d'une fonction f, de sa dérivée f', et de l'une de ses primitives F.
Expliquer quel graphe correspond à quelle fonction.



Exercise 20 Calc. : ✗

5 marks

Un corps se déplace en ligne droite, entre $t = 0$ et $t = 6$ (en secondes), avec une vitesse $v(t) = 4t$ (en mètres par seconde).
La dérivée $v'(t)$ de la vitesse est l'accélération.
La position du corps le long de la ligne droite est modélisée par une primitive $V(t)$ de la vitesse.

a) Quelle est la vitesse initiale du corps ? Quelle vitesse atteint-il après 3 secondes ?

b) Calculer l'accélération en fonction du temps t.

c) Calculer la primitive V de la fonction v pour laquelle $V(0) = 10$.

d) Quelle distance le corps a-t-il parcouru pendant les 6 premières secondes ?

Exercise 21 Calc. : ✗

5 marks

La fonction ci-dessous montre l'écoulement d'un liquide. La fonction de débit est notée f. $f(t)$ est le débit instantané à l'instant t (en minutes), en litres par minute.



a) Ecrire une intégrale donnant l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, pour $0 \leq t \leq 5$.

b) Estimer cette aire avec la méthode des rectangles. On considérera des rectangles dont la base mesure 1 min. Donner une sous-estimation et une sur-estimation.

c) A quoi correspond l'aire entre la courbe de f et l'axe des abscisses, pour $0 \leq t \leq 5$?

d) Le liquide s'écoule dans un bidon de 25 litres. Le bidon sera-t-il complètement rempli au bout de 5 minutes ?

Exercise 22 Calc. : ✗

On donne le graphe de la fonction $f(x) = 3x^2 - 6x$. 5 marks

a) Calculer une primitive de la fonction f.

b) Calculer l'aire entre la courbe de f et l'axe des abscisses, pour $0 \leq x \leq 3$.



Exercise 23 Calc. : ✗

5 marks

a) Calculer l'intégrale $\int_0^1 4e^{5x}\,dx$.

b) Calculer la primitive $F(x)$ de la fonction $f(x) = -3x^2 + x + 7$ pour laquelle $F(0) = 5$.

Exercise 24 Calc. : ✗

On donne les trois intégrales suivantes 5 marks

$$I = \int_{-2}^{2} f(x)\,dx = 12 \qquad J = \int_{2}^{5} f(x)\,dx = 3 \qquad K = \int_{5}^{-2} g(x)\,dx = 14$$

a) Faire un schéma des graphes de f et de g en respectant les conditions imposées par les intégrales.

b) Calculer les trois intégrales suivantes en utilisant les intégrales I, J et K.

$$A = \int_{-2}^{5} f(x)\,dx \qquad B = \int_{-2}^{5} (f(x) - g(x))\,dx \qquad C = \int_{-2}^{5} 5f(x)\,dx$$

Exercise 25 Calc. : ✗

On sait que la fonction F définie par $F(x) = x^2 + 2x$ est une primitive de la fonction f et que $\int_1^a f(x)\,dx = 5$, où a est un nombre réel positif.

Déterminer a. 5 marks

Exercise 26 Calc. : ✗

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{x^2}{2}$.
On cherche à déterminer l'aire A de la surface délimitée par le graphique de f, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 5$. (voir diagramme ci-dessous à gauche)



a) À l'aide des rectangles représentés (voir diagramme ci-dessus à droite), **déterminer** un encadrement de l'aire A recherchée. — 2 marks

b) **Expliquer** comment obtenir un encadrement plus fin avec cette technique. — 1 mark

c) **Montrer** que la fonction F définie par $F(x) = \dfrac{x^3}{6}$ est une primitive de la fonction f et calculer la valeur exacte de l'aire A. — 2 marks

Exercise 27 Calc. : ✗

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = -2x^2 \cdot (2 - x)$$

Le diagramme ci-dessous montre le graphique de f.



Écrire une intégrale qui donne l'aire de la surface grisée. — 5 marks
(Il n'est pas nécessaire de calculer cette intégrale, il suffit de donner une expression appropriée).

Exercise 28 Calc. : ✗

La vitesse d'un objet en mouvement est donnée par une fonction f.
Une primitive de f est donnée par la fonction F définie par

$$F(t) = \frac{2}{3}t^3 + 3t$$

où t est le temps exprimé en secondes et $F(t)$ est exprimé en mètres.

a) **Déterminer** une expression de la vitesse $f(t)$ en m/s. 2 marks

b) Le déplacement, en mètres, de l'objet en mouvement entre $t = a$ et $t = b$ est donné par

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

Calculer le déplacement de l'objet en mouvement entre $t = 0$ et $t = 3$. 3 marks

Exercise 29 Calc. : ✗

Le diagramme ci-dessous montre le graphique d'une fonction g.



Préciser pour chacune des expressions suivantes si elle représente l'aire de la surface hachurée. **Justifier** la réponse. 5 marks

a) $\int_a^c g(x)\,\mathrm{d}x$

b) $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c g(x)\,\mathrm{d}x$

c) $\left|\int_a^c g(x)\,\mathrm{d}x\right|$

d) $-\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c g(x)\,\mathrm{d}x$

Exercise 30 Calc. : ✗

On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x^3 - 2x^2 - 1$.
On considère aussi la fonction F définie par $F(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x + d$, où a, b, c et d sont quatre nombres réels.

a) **Trouver** les valeurs des trois paramètres a, b, et c pour que $F' = f$. 3 marks

b) **Trouver** la valeur du paramètre d pour que $F(1) = \frac{1}{12}$. 2 marks

Exercise 31 Calc. : ✗

Voici la courbe de la fonction f définie par :

$$f(x) = x^2 - 2x + 2$$



a) **Trouver** une approximation de l'aire sous la courbe de $x = 0$ à $x = 4$ en utilisant des rectangles à gauche de largeur 1. — 3 marks

b) En se basant sur la courbe, **discuter** si cette approximation est une sur-estimation de $\int_0^4 f(x)\,\mathrm{d}x$, ou une sous-estimation. **Justifier** votre réponse. — 2 marks

Exercise 32 Calc. : ✗

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

On rappelle que la fonction F définie par $F(x) = \ln(x)$ est une primitive de f.

Calculer l'aire sous la courbe de f de $x = 1$ à $x = \mathrm{e}$. — 5 marks

Exercise 33 Calc. : ✗

Consider the functions f and g defined by:

$f(x) = -x^2 - 4x + 5$

$g(x) = x + 5$

The diagram shows the graphs of f and g.



a) **Verify** that the graphs of f and g intersect on the coordinate axes. 2 marks

b) **Write** an integral that gives the area of the shaded region. 3 marks

You do not need to evaluate the integral, only to give an appropriate expression.